

Brambořík perský (*Cyclamen persicum*.)




Krátkodobá pokojová rostlina nanejvýš 0,2 m vys., s podzemní hlízou a trsem srdčitých listů s proměnlivou kresbou. Jednotlivé květy mají nazpět ohnuté korunní cípy a ze zašpičatělých poupat rozkvétají od září do března v rozmanitých barvách od bílé až po nachovou. Plod je tobolka.

Planě roste v křovinách východního Středozeří ale v četných kultivarech se odedávna pěstuje. Je světlomilný, v letních dnech je ale vhodné přistínění. V chladnějším prostředí kvete téměř celou

zimou, vždy vyžaduje vydatnou zálivku.

Především hlíza obsahuje jedovatý glykosid cyklamin, který se sušením nebo vařením ničí. Pro člověka jsou jedovaté už 0,3 g čerstvé hlízy. Následkem otravy jsou značné zažívací potíže a křeče, podává se aktivní uhlí. Při kontaktu s kůží vyvolává u citlivých osob lokální podráždění. Staří Egypťané naopak krmili bramboříkovými hlízami prasata, u nichž podporují trávení.



Doc. RNDr Jan Novák, DrSc,

foto: Ing. Helena Nováková

Bonsai Zahrada Kunice

www.bonsai-info.cz