

## Kosatečky-šperky března



Do systematicky složitého rodu – kosatec (*Iris*) – byly původně řazeny i časně zjara kvetoucí drobné cibulnaté byliny, později vyčleněné jako tzv. nízké kosatečky rodu *Iridodictyum*. K zvláště oblíbeným pro jeho jasné, milé, časně zjara se rozvíjející květy patří *Iridodictyum reticulatum*, který se v řadě modrokvětvých, fialových až načervenalých kultivarů (v mnoha odstínech a kombinacích) pěstuje nejčastěji.

*Iridodictyum danfordine* má žluté květy a není tak často k vidění i když v obchodní síti je také dosti dostupný. Robustnější je

*Iridodictyum histrioides* s většími a čistě modrými květy. Všechny kosatečky se obvykle prodávají pod jménem *Iris* (nikoliv *Iridodictyum*).

V zemi rostliny mají cibuli (tvoří ji jedna hlízovitě ztlustlá šupina), která má na povrchu slupku s výrazným síťkovitým žilkováním. Bezlistý stonek je velmi krátký a zakončený jediným květem. Úzké listy jsou zpočátku krátké, po odkvětu se však prodlužují. Předností je ranná doba kvetení -březen.

Základem úspěšného pěstování kosatečků je vhodné, slunné a v létě vysychající stanoviště (přes léto rostliny nesnášejí vlhko). Půda musí být humózní a propustná s příměsí písku. Cibulky se vysazují v září až v říjnu alespoň 5 cm hluboko. V červnu, po zatažení rostliny, je vhodné cibule vyndat a přes léto uložit na suchém a teplém místě. V teplých oblastech

našeho státu je však možné ponechat je v zemi i několik let. Snadno se kosatečky rozmnožují drobnými cibulkami, které se snadno oddělí od vyrytých matečných cibulí. Množí se i semeny, mladé rostliny však kvetou až po 4 letech. Nejčastěji se rostliny vysazují do skalek, na okraje záhonů s trvalkami aj.



Doc. RNDr Jan Novák, DrSc,  
foto: Ing. Helena Nováková

**Bonsai Zahrada Kunice**

[www.bonsai-info.cz](http://www.bonsai-info.cz)